



## Admirable de courtiller B



### Nom de la variété en France

Admirable de Courtiller

### Origine

Cette variété a été obtenue par M. Courtiller au XIX<sup>ème</sup> siècle dans la région de Saumur. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle est issue d'un croisement entre la Bicane B et le Chasselas.

### Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne.

### Données règlementaires

En France, l'Admirable de Courtiller B est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

### Utilisation

Variété de raisin de table.

### Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	2000	2008	2016
ha	909	898	369	35	22	8.9

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne à forte de poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes pentagonales, à cinq ou sept lobes avec un sinus pétiolaire à fond en U, peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe lisse, brillant, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et une densité nulle ou faible des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique ou ovoïde et dont l'épiderme peut prendre une teinte légèrement rosée en surmaturité.

## Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	223	239	182	188	252	240	233	239
Allèle 2	135	234	243	191	194	258	254	267	239

## Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas. Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

L'Admirable de Courtilier B présente une vigueur faible à moyenne et a un port demiérigé. Son potentiel de rendement est moyen. Il a tendance à émettre beaucoup de grappillons et il est parfois sensible à la coulure et au millerandage. Il est préférable d'implanter l'Admirable de Courtilier B sur des terrains secs et bien exposés.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Admirable de Courtilier B est peu sensible à la pourriture.

## Potentialités technologiques

Les grappes de l'Admirable de Courtilier B sont moyennes et peu compactes. Les baies sont moyennes à grosses, à saveur simple, avec une pellicule fine à moyenne et une pulpe juteuse.

## Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plate.
- Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1910, Ed. Masson, Paris.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



INRA  
SCIENCE & IMPACT



Montpellier

GenoVigne



Pl@ntNet

agropolis fondation