



## Aubun N



### Nom de la variété en France

Aubun

### Origine

L'Aubun N semble être originaire du Vaucluse.

### Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Murescola N" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication. Aucun synonyme n'est officiellement reconnu dans les autres pays de l'Union Européenne.

### Données réglementaires

En France, le Aubun N est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

### Utilisation

Variété de raisin de cuve

### Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2016
ha	1664	3284	5822	3664	1724	912	259

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- au rameau herbacé avec des entre-noeuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes à cinq ou sept lobes avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé et présence assez fréquente d'une dent sur le bord, des sinus latéraux à base en U avec présence assez fréquente d'une dent au fond, des dents moyennes à cotés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyanique moyenne des nervures, un limbe révoluté, ondulé entre les nervures, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou obovoïde.

## Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	229	253	176	194	252	240	243	239
Allèle 2	131	234	257	191	200	252	248	257	261

## Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie à 4 semaines après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

L'Aubun N a un port demi-érigé. C'est un cépage fertile et assez rustique.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage se montre peu sensible à la pourriture grise et à l'oïdium. En revanche sa sensibilité au mildiou et aux cicadelles est assez grande.

## Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. En conditions fertiles, ce cépage a beaucoup de mal à se colorer et les degrés sont faibles. En rouge, les vins obtenus sont généralement ordinaires et sans finesse, mais ce cépage peut donner des rosés agréables.

## Sélection clonale en France

Les deux clones agréés d'Aubun N portent les numéros 168 et 350.

## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1910, Ed. Masson, Paris.

## Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes oenologiques
168	Non précisée	ENTAV				
	1972					

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé

350	Non précisée	ENTAV				
	1975					

ENTAV  INRA®

Clone peu diffusé



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

