



Auxerrois B



Nom de la variété en France

Auxerrois

Origine

D'après les analyses génétiques publiées, ce cépage résulte d'un croisement entre le Pinot et le Gouais B. Son développement a été encouragé par la station de Laquenexy (Moselle). Après 1950, la Station de Recherches Viticoles et Oenologiques de Colmar l'a fortement développé dans le vignoble alsacien.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France pour cette variété. En Allemagne, l'Auxerrois B peut officiellement être désigné les noms "Auxerrois Blanc" et "Pinot Auxerrois".

Données règlementaires

En France, le Auxerrois B est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne". Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union Européenne : Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays Bas, République Tchèque et Royaume Uni.

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2016
ha	299	486	1193	1579	1904	2225	2479

Éléments de description

L'identification fait appel :

- aux jeunes feuilles de couleur verte ou jaune,
- aux feuilles adultes à trois lobes avec un sinus pétiolaire en V ouvert, des dents courtes par rapport à leur largeur, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe bullé, involuté et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	232	239	178	188	244	238	227	249
Allèle 2	149	236	243	186	196	246	248	235	271

Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas. Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage est bien adapté aux zones septentrionales et aux terroirs calcaires. Sa vigueur est moyenne et il est peu fertile en taille courte.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Auxerrois B est assez sensible aux vers de la grappe, au mildiou, à la pourriture grise et surtout à l'oïdium.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies de l'Auxerrois B sont petites. Les vins obtenus sont assez fins, légèrement aromatiques et peu acides.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés d'Auxerrois B portent les numéros 56 et 57.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes oenologiques
56	Haut-Rhin	INRA	moyenne	moyen	moyenne à supérieure	
	1971	Alsace	moyen			
	4.28 ha					vins typiques du cépage
57	Haut-Rhin	INRA	moyenne à supérieure	moyen à supérieur	moyenne	
	1971	Alsace	moyen à supérieur			
	2.66 ha					vins typiques du cépage

ENTAV INRA®

ENTAV INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)