



Carcajolo N



Nom de la variété en France

Carcajolo

Origine

Ce cépage se rencontre dans le bassin méditerranéen et notamment en Espagne et au Portugal.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France pour cette variété.

Dans l'Union Européenne, le Carcajolo N peut officiellement être désigné par d'autres noms : Caricagiola N (Italie) et Tinta Caiada (Portugal).

Données règlementaires

En France, le Carcajolo n est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

Cette variété est également inscrite aux Catalogues d'autres pays membres de l'Union Européenne : Italie et Portugal.

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

| | 1958 | 2000 | 2008 | 2016 |
|----|------|------|------|------|
| ha | 67 | 1 | 1 | 22 |

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes pentagonales, à trois ou cinq lobes avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des sinus latéraux avec parfois présence d'une dent au fond, des dents petites, longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, et à la face inférieure, une faible densité des poils couchés,
- aux baies de forme elliptique courte, avec une forte prune.

Profil Génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allèle 1 | 131 | 219 | 239 | 176 | 186 | 252 | 240 | 243 | 239 |
| Allèle 2 | 131 | 236 | 239 | 186 | 188 | 262 | 254 | 257 | 251 |

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas. Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage est vigoureux, assez productif et doit être conduit en taille courte.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Carcajolo N se montre peu sensible à l'oïdium. En revanche, il est sensible à la pourriture acide.

Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes et les baies sont grosses. Le potentiel d'accumulation des sucres du Carcajolo N est moyen. Ce cépage permet d'élaborer des vins bien colorés, de structure légère et moyennement aromatiques, mais souvent assez durs, manquant de finesse et d'acidité.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Carcajolo N porte le numéro 946. Un conservatoire d'une vingtaine de clones a été implanté en 2005 dans le vignoble corse.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Description des clones agréés en France

| N° de Clone | Identité et disponibilités | | Données Agronomiques | | Données Technologiques | |
|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | Origine | Sélection | Fertilité | Niveau de production | Richesse en sucre | Potential couleur |
| | Année d'agrément | Références Agronomiques | Poids des grappes | Vigueur | Acidité totale | Structure tannique |
| | Surface en multiplication | | Taille de baies | Sensibilité au Botrytis | Intensité aromatique | Aptitudes oenologiques |
| 946 | Corse-du-Sud | ENTAV | | | | |
| | 1990 | Corse-du-Sud | | | | |

ENTAV 

Clone conforme aux caractéristiques du cépage



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)