



Cinsaut N



Nom de la variété en France

Cinsaut

Origine

Ce cépage méridional semble être d'origine provençale.

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Cinsault N" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication. Dans l'Union Européenne, le Cinsaut N peut officiellement être désigné par d'autres noms : Cinsault vrai (Chypre), Ottavianello (Italie) et Senzo (Bulgarie).

Données réglementaires

En France, le Cinsaut N est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne". Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union Européenne : Bulgarie, Chypre, Grèce, Italie et Portugal.

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2016
ha	10915	18188	51643	48184	32955	24773	18588

Éléments de description

L'identification fait appel : - à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés, - aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des sinus latéraux assez profonds à fond en V, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou avec un côté concave et un côté convexe, un limbe légèrement involuté, en particulier au niveau du lobe principal, et à la face inférieure, une densité faible de poils couchés et une densité moyenne de poils dressés, - aux baies de forme elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	223	243	176	188	256	238	227	255
Allèle 2	131	223	247	178	204	260	248	233	261

Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas. Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage est fertile, productif, très résistant à la sécheresse et peu sensible à la brunissure. En conditions fertiles, les rendements sont trop élevés et les produits obtenus sont alors de moindre qualité. Le Cinsaut N doit donc être cultivé préférentiellement dans les terroirs pauvres et secs ; dans ces conditions, il permet d'obtenir une production régulière. C'est un cépage peu vigoureux (bois de faible diamètre), à port retombant qui doit être taillé court. Le vieillissement des souches est assez rapide. En zone calcaire et au printemps, le Cinsaut N peut extérioriser assez facilement des symptômes de chlorose.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Cinsaut N est sensible aux maladies du bois (esca, eutypiose), aux acariens, aux vers de la grappe (Eudemis) et à la pourriture grise. Par contre, il se montre moyennement sensible à l'oïdium.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont très grosses. Les rendements en jus sont élevés. Avec ce cépage, il est cependant possible d'obtenir sur de bons terroirs peu fertiles (schistes par exemple) et avec de faibles rendements, des produits fruités, agréables et souples et notamment d'excellents rosés.




Sélection clonale en France





























Les vingt clones agréés de Cinsaut N portent les numéros 3, 4, 5, 67, 91, 92, 103, 104, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 320, 321 et 322. Un conservatoire d'une centaine de clones a été implanté dans le vignoble des Côtes de Provence (Var) en 2006.




Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi. - Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage. - Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier. - Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes oenologiques
3	Gard	ENTAV	supérieure	supérieur	moyenne	
	1971	Languedoc	supérieur	supérieure		
	3.79 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA [®]						
4	Gard	ENTAV	moyenne	moyen	inférieure à moyenne	
	1971	Languedoc	moyen			
	0.25 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA [®] clone bien représentatif du cépage.						
5	Gard	ENTAV	supérieure	moyen à supérieur	moyenne	
	1971	Languedoc	moyen	supérieure		
	5.03 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA [®]						
67	Gard	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur à moyen	supérieure	

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes oenologiques
1971	Languedoc	inférieur à moyen				
0.22 ha					vins typiques du cépage	
ENTAV  INRA  clone porteur du virus de l'enroulement 2. Production irrégulière.						
91	Gard	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur à moyen	moyenne	
	1971	Languedoc	moyen	inférieure		
						vins typiques du cépage
ENTAV  INRA 						
92	Gard	ENTAV	inférieure	inférieur	supérieure	
	1971	Languedoc	moyen	inférieure		
	0.65 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA  clone apprécié pour ses caractéristiques agronomiques						
103	Haute-Garonne	ENTAV	inférieure à moyenne	inférieur à moyen	supérieure	
	1971	Languedoc	moyen			
	2.61 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA  clone apprécié pour ses caractéristiques agronomiques						
104	Gard	ENTAV	supérieure	moyen	moyenne	
	1971	Languedoc	inférieur à moyen			
	0.80 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA  production régulière						
252	Aude	INRA		supérieur	supérieure	
	1973	Languedoc	supérieur			
	0.83 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA 						
253	Non précisée	INRA				
	1973					
						Clone peu diffusé
ENTAV  INRA 						
254	Aude	INRA	supérieure	supérieur	moyenne	
	1973	Languedoc	supérieur			
						vins typiques du cépage
ENTAV  INRA 						
255	Aude	INRA	inférieure	inférieur	supérieure	
	1973	Languedoc	inférieur			
	0.42 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA  clone porteur du virus de l'enroulement 2						
256	Aude	INRA	moyenne	moyen à supérieur	inférieure	
	1973	Languedoc	supérieur			
						vins typiques du cépage
ENTAV  INRA 						
258	Non précisée	INRA				
	1973					
						Clone peu diffusé
ENTAV  INRA 						
259	Non précisée	INRA				
	1973					
						Clone peu diffusé
ENTAV  INRA 						
260	Aude	INRA	moyenne	moyen à supérieur	inférieure	
	1973	Languedoc	supérieur			
						vins typiques du cépage
ENTAV  INRA 						
261	Aude	INRA	moyenne	moyen à supérieur	moyenne	
	1973	Languedoc	supérieur			
	0.46 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA 						
320	Aude	INRA	moyenne	moyen	supérieure	
	1975	Languedoc	moyen			

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	<i>Origine</i>	<i>Sélection</i>	<i>Fertilité</i>	<i>Niveau de production</i>	<i>Richesse en sucre</i>	<i>Potentiel couleur</i>
	<i>Année d'agrément</i>	<i>Références Agronomiques</i>	<i>Poids des grappes</i>	<i>Vigueur</i>	<i>Acidité totale</i>	<i>Structure tannique</i>
	<i>Surface en multiplication</i>		<i>Taille de baies</i>	<i>Sensibilité au Botrytis</i>	<i>Intensité aromatique</i>	<i>Aptitudes oenologiques</i>
0.38 ha					vins typiques du cépage	
ENTAV  INRA [®] clone apprécié pour ses caractéristiques agronomiques						
321	Aude	INRA	moyenne	moyen	supérieure	
	1975	Languedoc	moyen			
	0.26 ha					vins typiques du cépage
ENTAV  INRA [®] clone porteur du virus de l'enroulement 2						
322	Non précisée	INRA				
	1975					Clone peu diffusé
ENTAV  INRA [®]						



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

