



Furmint B



Nom de la variété en France

Furmint

Origine

Ce cépage est originaire de Hongrie. D'après les analyses génétiques publiées, le Furmint B est probablement un descendant du Gouais B.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France pour cette variété. Dans l'Union Européenne, le Furmint B peut officiellement être désigné par d'autres noms : Furmint de Minis (Roumanie), Kéknyelű (Hongrie) et Sipon (Slovénie).

Données réglementaires

En France, le Furmint B est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

Cette variété est également inscrite aux Catalogues d'autres pays membres de l'Union Européenne : Autriche, Bulgarie, Chypre, Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France



Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes cunéiformes ou orbiculo-réniformes, entières ou à trois lobes avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire ouvert en U ou à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes ou avec un côté convexe et un côté concave, nettement mucronées, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe épais, involuté, finement bullé, et à la face inférieure,

une densité forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou elliptique courte.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	223	239	176	188	238	238	227	263
Allèle 2	151	238	249	191	204	250	240	247	271

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas. Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Furmint B est un cépage de vigueur moyenne à forte avec un port érigé. Il doit être taillé court. Il est parfois sensible au millerandage.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Furmint B est sensible à la pourriture grise.

Potentialités technologiques

Les grappes du Furmint B sont petites mais les baies sont grosses. Le potentiel en sucre de ce cépage est moyen. Il permet d'élaborer des vins blancs secs corsés, puissants, avec une acidité élevée. Lorsque qu'il est récolté après passerillage ou en présence de pourriture noble, il peut donner de grands vins liquoreux.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Furmint B porte le numéro 1149.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	<i>Origine</i>	<i>Sélection</i>	<i>Fertilité</i>	<i>Niveau de production</i>	<i>Richesse en sucre</i>	<i>Potentiel couleur</i>
	<i>Année d'agrément</i>	<i>Références Agronomiques</i>	<i>Poids des grappes</i>	<i>Vigueur</i>	<i>Acidité totale</i>	<i>Structure tannique</i>
	<i>Surface en multiplication</i>		<i>Taille de baies</i>	<i>Sensibilité au Botrytis</i>	<i>Intensité aromatique</i>	<i>Aptitudes oenologiques</i>
1149	Bouches-du-Rhône 2010	IFV				
						vins typiques du cépage

ENTAV  INRA[®]



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)