



Gamay de bouze N



Nom de la variété en France

Gamay de Bouze

Origine

Cette variété provient d'une mutation du Gamay N.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne.

Données règlementaires

En France, le Gamay de Bouze N est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

Cette variété est également inscrite au Catalogue de la Bulgarie.

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1998	2008	2016
ha	77	54	385	310	132

* : voir Gamay Fréaux

Éléments de description

L'identification fait appel :

- aux jeunes feuilles légèrement bronzées,
- aux baies qui présentent une couleur de l'épiderme pratiquement verte jusqu'à la véraison et une pulpe colorée à maturité.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	232	239	178	194	244	238	216	239

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 2	135	236	249	186	204	246	238	245	271

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Les aptitudes de ce cépage sont proches de celles des autres types de Gamay teinturier et du Gamay N.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le comportement du Gamay de Bouze N vis-à-vis des maladies et des ravageurs est comparable à celui du Gamay N.

Potentialités technologiques

Les grappes sont petites et les baies sont petites à moyennes. Les vins obtenus sont colorés (moins que le Gamay Fréaux N mais beaucoup plus que le Gamay N). Ils sont moins fruités que ceux élaborés à partir du Gamay N.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Gamay de Bouze N portent les numéros 223 et 431. Un conservatoire d'une trentaine de clones a été planté en 2006 dans le vignoble du Rhône.

Références bibliographiques


- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plateau.
- Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
223	Non précisée	ENTAV				
	1973	Val-de-Loire				
	0.73 ha					vins typiques du cépage

ENTAV 

431	Non précisée	ENTAV	supérieure	supérieur	moyenne	très supérieur
	1976	Bordelais Val-de-Loire	moyen	moyenne	moyenne à supérieure	supérieure
	0.08 ha		moyenne	moyenne à supérieure		vins fruités, structurés et colorés

ENTAV  Les résultats figurant ci-dessus ont été donnés en comparaison de la moyenne des clones de Gamay N. Par rapport à cette référence, la teneur en anthocyanes est deux fois plus importante et l'indice de polyphénols totaux est supérieur de 20%.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

