



Grenache gris G



Nom de la variété en France

Grenache gris

Origine

Cette variété correspond à la mutation grise du Grenache N.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France pour cette variété. Dans l'Union Européenne, le Grenache gris G peut officiellement être désigné par d'autres noms : Garnache Roja (Espagne) et Garnacha Gris (Espagne).

Données règlementaires

En France, le Grenache gris G est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

Cette variété est également inscrite au Catalogue de l'Espagne.

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2016
ha	8652	9362	16286	12083	2926	1683	1657

De 1958 à 1988 Grenache blanc B et gris G

Éléments de description

La description correspond à celle du Grenache N, à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui, dans ce cas, est grise.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	135	223	239	191	188	258	240	243	239

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 2	143	238	243	191	188	258	254	243	249

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Les aptitudes sont proches de celles des autres types de Grenache, mais il semble être un peu plus productif que le Grenache blanc B.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La sensibilité et la résistance aux maladies sont comparables à celles du Grenache blanc B, mais avec une sensibilité plus marquée à la pourriture grise.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont petites à moyennes. Le Grenache gris G est surtout utilisé pour l'élaboration de vins doux naturels, et entre dans la production des vins gris (dans les sables du littoral méditerranéen).

Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Grenache gris G portent les numéros 147, 148 et 150. Des prospections ont été menées récemment dans le vignoble de Banyuls (Pyrénées- Orientales).

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes oenologiques
147	Aude	INRA	inférieure	inférieur à moyen	moyenne	
	1972	Languedoc	moyen		moyenne	
	0.13 ha		moyenne			vins typiques du cépage
148	Aude	INRA	moyenne	moyen	moyenne	
	1972	Languedoc Vallée-du-Rhône	moyen		moyenne	
	0.60 ha		moyenne			vins typiques du cépage
150	Aude	INRA	moyenne	moyen	moyenne	
	1972	Languedoc Vallée-du-Rhône	inférieur à moyen		moyenne	
	0.30 ha		moyenne			vins typiques du cépage

ENTAV INRA® clone porteur du virus de l'enroulement 2



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

