



Olivette blanche B



Nom de la variété en France

Olivette blanche

Origine

Cette variété d'origine inconnue ne correspond pas à la forme blanche de l'Olivette noire N.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France pour cette variété. En Italie, l'Olivette blanche peut officiellement être désigné par le nom "Ciminnita B".

Données règlementaires

En France, l'Olivette blanche B est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne".

Cette variété est également inscrite au Catalogue de l'Italie.

Utilisation

Variété de raisin de table

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	2000	2008	2016
ha	19	15	1	2	1.1

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,- aux feuilles adultes orbiculaires, entières ou à cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire ouvert, à fond en V, des dents petites, courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation des nervures nulle, un limbe lisse, brillant, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et des poils couchés,
- aux fleurs de sexe femelle,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	133	232	243	182	188	252	254	243	261
Allèle 2	135	236	249	191	204	258	254	259	271

Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas. Epoque de maturité : 3ème époque, 5 semaines après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Olivette blanche B est une variété tardive, de vigueur moyenne, à port érigé à demi-érigé. Elle peut être conduite en taille longue. De par son caractère femelle, l'Olivette blanche B est très sensible à la coulure et au millerandage.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Olivette blanche B est très peu sensible à la pourriture grise.

Potentialités technologiques

Les grappes sont petites à moyennes et lâches. Les baies sont grosses, de taille irrégulière du fait du millerandage, avec une pellicule épaisse et une pulpe charnue à saveur simple.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 2. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



INRA
SCIENCE & IMPACT



Montpellier

GenoVigne



PlantNet

agropolis fondation