



## Pineau d'aunis N



### Nom de la variété en France

Pineau d'Aunis

### Origine

Ce cépage se rencontre dans le Val de Loire.

### Synonymie

### Données règlementaires

En France, le Pineau d'Aunis N est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

### Utilisation

Variété de raisin de cuve

### Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2016
ha	1741	1432	1288	645	541	456	447

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles rougeâtres à plages bronzées,
- au rameau avec des entre-noeuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes à côtés rectilignes, une forte pigmentation anthocyanique des nervures, un limbe involuté, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.

### Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	137	229	239	172	188	244	238	235	239

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 2	149	236	249	178	204	248	266	243	271

## Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Pineau d'Aunis N est un cépage de vigueur moyenne, très sensible à la brunissure et fertile en taille courte. Sa production a parfois tendance à être irrégulière (alternance). Il se montre par ailleurs sensible à la chlorose.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Du fait de la compacité de ses grappes, ce cépage est sensible à la pourriture grise. Il est par contre peu sensible à l'excoriose.

## Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes et les baies sont de petite taille. Le Pineau d'Aunis N permet d'obtenir des vins légers et peu colorés pour l'élaboration de rosés ou de vins de base pour effervescents. La qualité chute rapidement lorsque les rendements augmentent avec ce cépage.

## Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Pineau d'Aunis N portent les numéros 235 et 289. Un conservatoire de ce cépage a été installé dans le Vendomois (Loir et Cher) en 1997. Il rassemble 350 clones.

## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-Plage.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1990, Ed. Dehan, Montpellier.
- Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1902-1910, Ed. Masson, Paris.

## Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication		Taille de baies	Sensibilité au Botrytis	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
235	Loir-et-Cher	ENTAV				
	1973	Val-de-Loire				
289	Maine-et-Loire	ENTAV				
	1973	Val-de-Loire				

ENTAV  INRA®

Peu de différence entre les clones n°235 et 289 qui sont peu diffusés. Il a été toutefois noté une productivité légèrement supérieure pour le clone 289.

ENTAV  INRA®

Peu de différence entre les clones n°235 et 289 qui sont peu diffusés. Il a été toutefois noté une productivité légèrement supérieure pour le clone 289.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

