



Saint-côme B



Nom de la variété en France

Saint-Côme

Origine

Ce cépage autochtone de l'Aveyron est, d'après les analyses génétiques publiées, probablement un descendant du Gouais B.

Synonymie

Données règlementaires

En France, le Saint-Côme B est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne".

Utilisation

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France

ha

2016

3.3

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité de poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- au rameau avec une forte pigmentation anthocyanique,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes avec des sinus latéraux à fonds arrondis, un sinus pétiolaire peu ouvert en V ou à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe grossièrement bullé, légèrement révoluté et gaufré, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés sur le limbe et une forte densité des poils dressés sur les nervures,
- aux baies qui sont de forme arrondie avec une pruline importante.

Profil Génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allèle 1 | 131 | 236 | 247 | 172 | 204 | 238 | 238 | 227 | 239 |
| Allèle 2 | 137 | 238 | 249 | 176 | 204 | 248 | 238 | 243 | 249 |

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour avant le Chasselas. Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Saint-Côme B est un cépage peu fertile qui semble plus adapté à une taille longue.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Du fait de la compacité de ses grappes, le Saint-Côme B est un peu sensible à la pourriture grise. Il ne semble pas présenter de sensibilité particulière aux autres maladies cryptogamiques.

Potentialités technologiques

Les grappes sont petites à moyennes et les baies sont moyennes. Le potentiel en sucre du Saint-Côme B est bon ; ce cépage permet d'élaborer des vins blancs avec une acidité élevée.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de ce cépage. Un conservatoire d'une dizaine de clones a été implanté en 2004 en Aveyron.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi.
- Documentation interne du Domaine de Vassal. 1949-2011, INRA, Marseillan-plateau.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



INRA
SCIENCE & IMPACT



Montpellier
SupAgro

GenoVigne



Pl@ntNet

agropolis fondation