



4010 Castel



Nombre de la variedad en Francia (y denominación habitual)

4010 Castel (4010 Cl)

Obtendor / seleccionador y año de obtención

Pierre Castel, 1906.

Origen genético

Esta variedad fue obtenida a partir de un cruce entre *Vitis riparia* cv. Grand glabre y Aramon Rupestris Ganzin nº1.

Evolución de las superficies de cepa-madre

	1955	1965	1975	1985	1995	2005	2015
ha	1	1	2	2	1	0.5	0.5

Superficie estimada del viñedo francés injertado con este portainjerto y

600 ha. Aquitania.

Elementos de descripción ampelográfica

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven semi-abierta, con una densidad nula a muy baja de los pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con un contorno liso y una pigmentación antociánica moderada a intensa,
- a las hojas adultas reniformes, con bordes hacia el haz, con un seno peciolar abierto en forma de llave,
- a las flores del sexo masculino,
- a los sarmientos de color marrón-rojizo a violáceo, con una densidad nula de pelos tumbados y erguidos.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	135	232	243	236	188	256	236	235	249
Alelo 2	159	261	251	236	190	256	236	243	249

Resistencia a los parásitos de los suelos

El grado de tolerancia del 4010 CI a la filoxera radicícola es moderado. Por tanto, debe utilizarse en condiciones poco favorables a esta plaga, pero su resistencia a los nematodos *Meloidogyne arenaria* y *Meloidogyne incognita* es óptima.

Adaptación al medio

El grado de tolerancia a la clorosis del 4010 CI es bajo y solo tolera hasta un 6 % de caliza activa. El 4010 CI absorbe mal el magnesio. Se adapta a suelos ácidos, muy poco o nada calcáreos, bastante profundos, que pueden ser compactos, pero que ofrezcan una alimentación hídrica suficiente.

Interacción con el injerto y objetivos de producción

El vigor conferido por el 4010 CI es bastante elevado y este portainjerto tiene tendencia a favorecer la fertilidad. No obstante, también favorece la precocidad del ciclo vegetativo.

Aptitudes para la multiplicación vegetativa

El 4010 CI presenta una producción de tronco media (30 000 a 40 000 m/ha), pero presenta buenas aptitudes para el estaquillado y el injertado.

Resistencia a los parásitos de la corona aérea

El grado de tolerancia del 4010 CI a la filoxera gálica es moderado y también presenta un grado de resistencia media al mildiu.

Selección de clones en Francia

En Francia, los dos clones autorizados de 4010 CI llevan los números 243 y 244. De ellos, el clon 243 se multiplicó en 50 áreas de vides madre productoras de material certificado en 2017.

Los datos proceden de: Les chiffres de la pépinière viticole 2017, Datos y balances de FranceAgriMer, mayo de 2018.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

