



## Amandin B



### Nombre de la variedad en Francia

Amandin

### Origen

Esta variedad se obtuvo en 1979 por el INRA. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el 7489 INRA y el Muscat de Hambourg.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Amandin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A.

### Uso

Variedad ornamental para aficionados.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia



### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes brillantes, verdes con zonas bronceadas o rojizas,
- a las hojas adultas cuneiformes, enteras o de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto, dientes medianos a largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula o muy reducida de los nervios, un limbo liso, brillante, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica u ovoide, con un ligero sabor a moscatel.

## Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	133	229	247	176	186	256	240	235	255
Alelo 2	143	236	249	186	192	262	254	243	271

## Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Amandin presenta un vigor medio a elevado. Es una variedad bastante fértil con un porte semi-erguido u horizontal. El Amandin se puede manejar en poda larga moderada y debe ser empalizado.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Amandin es poco sensible al mildiu, al oídio, a la antracnosis, al black rot y a la podredumbre gris, pero debe injertarse.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos del Amandin son medianos a grandes, poco compactos y las bayas son medianas, jugosas, con una piel gruesa.

## Selección de clones en Francia

El único clon autorizado del Amandin lleva el número 5002.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
5002	1987	INRA				



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)