



Aubun N



Nombre de la variedad en Francia

Aubun

Origen

El Aubun parece ser originario de Vaucluse.

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente «Murescola» por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Aubun está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1664	3284	5822	3664	1724	912	247

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de estrías rojas,
- a las hojas adultas de cinco o siete lóbulos con senos laterales con base en U y un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar poco abierto o cerrado y un diente bastante frecuente en el borde, dientes medianos de lados convexos o rectilíneos, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés, ondulado entre los nervios y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada u ovoide.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	229	253	176	194	252	240	243	239
Alelo 2	131	234	257	191	200	252	248	257	261

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Aubun posee un porte semi-erguido. Es una variedad fértil y bastante rústica.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

Esta variedad no sufre en exceso los efectos de la podredumbre gris y al oídio. Por el contrario, su sensibilidad al mildiu y los cicadélidos es bastante elevada.

Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son grandes. En condiciones fértiles, esta variedad tiene dificultades para producir color y los grados son bajos. Los vinos tintos obtenidos suelen ser vulgares y sin finura, pero esta variedad puede producir unos vinos rosados agradables.

Selección de clones en Francia

Los dos clones autorizados de Aubun llevan los números 168 y 350. En 2001 se plantó un conservatorio de 3 clones en el departamento de Vaucluse.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Córcega, 2016, San Giuliano, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
168	Non précisée	ENTAV				
	1972					

ENTAV  INRA®

El clon no está ampliamente distribuido.

350	Non précisée	ENTAV				
	1975					

ENTAV  INRA®

El clon no está ampliamente distribuido.



