



## Beaugaray N



### Nombre de la variedad en Francia

Beaugaray

### Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA y la SICAREX Beaujolais en los años '80 y procede de un cruce entre el Gamay y el Heroldrebe.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Beaugaray está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2014, en la lista A y está clasificado.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia



### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven con densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde amarillento, con zonas bronceadas, con una densidad media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo violáceo en la cara dorsal, con nudos achatados y yemas con una pigmentación antociánica intensa de las escamas,
- a las hojas adultas pentagonales, enteras o de tres a cinco lóbulos, con senos laterales poco profundos, un seno peciolar cerrado, de lóbulos muy superpuestos, dientes cortos en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo plano, con hinchazón, abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados y una densidad nula de pelos erguidos,

- a las bayas de forma redondeada.

## Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
<b>Alelo 1</b>	131	236	239	178	194	246	238	216	249
<b>Alelo 2</b>	141	238	249	186	204	260	254	259	271

## Fenología

Época de desborre: 2 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Beaugaray es bastante vigoroso, moderadamente fértil y con un porte semi-erguido. Esta variedad puede ser sensible al millerandaje.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Beaugaray se muestra sensible al oídio y al mildiu y parece ser más resistente a la podredumbre gris. Esta variedad es sensible a las enfermedades de la madera (yesca).

## Potenciales tecnológicos

Los racimos del Beaugaray son de tamaño mediano y compactos. Las bayas también son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa blanda y muy jugosa. Los vinos presentan un buen color, son estructurados y tánicos. Posee un perfil aromático afrutado (frutas maduras) y floral (rosa y violeta).

## Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Beaugaray lleva el número 1269.

## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

Nº de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1269	Alsace	INRA - Sicarex Beaujolais - IFV				
	2018					

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)