




Berlandieri - Colombard 2



Nombre de la variedad en Francia (y denominación habitual)

Berlandieri - Colombard 2 (BC 2)

Obtendor / seleccionador y año de obtención

M. Blanchard y Jean-Louis Vidal, 1894.

Origen genético

Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad se trata en realidad de un cruce entre *Vitis berlandieri* y *Vitis vinifera* cv. Ugni blanc.

Evolución de las superficies de cepa-madre

	1945	1975	1985	2005	2015
ha	0.03	1	1	0	0

Superficie estimada del viñedo francés injertado con este portainjerto y

35 ha.

Elementos de descripción ampelográfica

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven abierta, con una densidad elevada de pelos tumbados y una pigmentación antocianica en ribete,
- a las hojas jóvenes bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con un contorno muy asurcado,
- a las hojas adultas medianas a grandes, cuneiformes, con un limbo bastante grueso, senos laterales superiores poco profundos, un seno peciolar en lira poco abierto, dientes de largo medio en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, y una densidad baja a media de pelos erguidos en los peciolas y en los nervios del envés del limbo,
- a las flores hermafroditas,
- a las bayas de pequeño tamaño, de forma redondeada y con un color de la epidermis azul negro.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	141	223	231	252	192	250	252	233	243
Alelo 2	143	234	249	254	194	252	254	247	249

Resistencia a los parásitos de los suelos

El grado de tolerancia del BC 2 a la filoxera radicícola es moderado a elevado.

Adaptación al medio

El BC 2 posee una buena adaptación a los suelos calcáreos y tolera hasta un 40 % de caliza activa.

Interacción con el injerto y objetivos de producción

Las plantas injertadas en este portainjerto presentan una rapidez de desarrollo óptima.

Aptitudes para la multiplicación vegetativa

La aptitud al estaquillado del BC 2 es moderada y presenta una buena aptitud para el injertado.

Resistencia a los parásitos de la corona aérea

El BC 2 es sensible al mildiu.

Selección de clones en Francia

En Francia, todavía no existe un clon autorizado para esta variedad.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

