



## Canner seedless B



### Nombre de la variedad en Francia

Canner seedless

### Origen

Esta variedad fue obtenida en 1931 por Harold P. Olmo (California) mediante el cruce entre la Hunisa y la Sultanine.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Canner seedless está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Italia.

### Uso

Variedad de uva para la industria conservera.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia



### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas o rojizas,
- a las hojas adultas orbiculares de pequeño tamaño, de cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto con fondo en U, dientes pequeños a medianos, de lados convexos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo plano, brillante, con hinchazón ligera y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma elíptica larga.

## Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
<b>Alelo 1</b>	141	229	239	191	188	258	246	216	249
<b>Alelo 2</b>	149	232	239	191	188	262	248	243	273

## Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Canner seedless posee un vigor medio a elevado y tiene un porte semi-erguido u horizontal. Debe ser empalzado y manejarse en poda larga.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Canner seedless es un poco sensible al oídio, al mildiu y a la excoriosis.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos del Canner seedless son grandes, moderadamente compactos. Las bayas son apirenas, medianas, de sabor simple, con una piel de grosor medio y una pulpa firme.

## Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Canner seedless lleva el número 975.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
975	Gard 1990	ENTAV				

ENTAV INRA®

Clon conforme a las características de la variedad.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)