



Centennial seedless B



Nombre de la variedad en Francia

Centennial seedless

Origen

Esta variedad fue obtenida en 1966 por Harold P. Olmo (California) mediante el cruce entre el Gold y el Q 25-6 (F2 Emperor x Sultana moscata).

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos reglamentarios

En Francia, el Centennial seedless está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: España, Italia y Portugal.

Uso

Variedad de uva de mesa.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia



Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes rojizas,
- a las hojas adultas cuneiformes u orbiculares, de cinco, siete o más de siete lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U, poco abierto, dientes grandes y largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica media a intensa de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica larga o, en ocasiones, arqueada y un sabor simple o ligeramente aromático (a

moscatel).

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	133	234	239	176	188	248	238	216	263
Alelo 2	133	236	239	191	188	256	254	235	271

Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Centennial seedless es una variedad muy vigorosa con un porte semi-erguido u horizontal. Debe ser empalizada y manejarse en poda larga.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Centennial seedless es un poco sensible a la podredumbre gris.

Potenciales tecnológicos

Los racimos del Centennial seedless son grandes a muy grandes y moderadamente compactos. Las bayas son apirenas, grandes, con una piel poco gruesa, una pulpa firme y un sabor muy agradable. El deshojado debe ser moderado pues las bayas son un poco sensibles al pardeado. En determinadas condiciones, tras la cosecha, los escobajos se marchitan con rapidez y las bayas tienen tendencia a desgranarse. Las uvas presentan una aptitud media para la conservación y el transporte.

Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Centennial seedless lleva el número 1087.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1087	Non précisée	ENTAV				
	2004	Provenza Sudoeste				

ENTAV  INRA®

Clon conforme a las características de la variedad.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

