



## Chenanson N



### Nombre de la variedad en Francia

Chenanson

### Origen

Esta variedad fue obtenida en 1958 por el INRA mediante el cruce entre la Grenache y la Jurançon.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Chenanson está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1988	2000	2008	2018
ha	250	571	605	437

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde o amarillo,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con un seno peciolar en U abierto, dientes cortos a medianos respecto a la anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

## Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
<b>Alelo 1</b>	135	223	239	188	188	252	248	233	239
<b>Alelo 2</b>	149	236	262	191	202	258	254	243	251

## Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Chenanson es una variedad muy fértil que debe podarse en corto. Es preciso intentar controlar la producción, en particular, los primeros años, pues puede presentar síntomas de pardeado y desecado del escobajo (sobre todo, con el SO4). Esta variedad se puede manejar en gobelet y se adapta a los terrenos cálidos y secos.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Chenanson es poco sensible a la podredumbre gris.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos son grandes y las bayas pequeñas. Esta variedad permite la obtención de vinos suaves, afrutados, generosos y bastante típicos.

## Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Chenanson lleva el número 602.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
602		INRA				
	1978	Languedoc				

ENTAV INRA®



Esta obra está puesta a disposición según los términos de la [Licencia Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)