



Chenin B



Nombre de la variedad en Francia

Chenin

Origen

Esta variedad es originaria del Valle del Loira y, probablemente, de Anjou.

Sinonimia

En Bulgaria, el Chenin es oficialmente denominado "Shanin". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Chenin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bélgica, Bulgaria, Chipre, España, Italia, Malta, Portugal y República Checa.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	16594	14199	9552	9054	10042	9777	10085

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o lóbulos ligeramente superpuestos, de dientes medianos de lados convexos, una intensa pigmentación antociánica de los nervios, un limbo con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos tumbados,
- a las bayas que son de forma elíptica.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	225	239	172	188	248	240	233	255
Alelo 2	149	229	257	186	194	252	248	247	271

Fenología

Época de desborre: 1 día antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas a 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Chenin es una variedad vigorosa y fértil con un potencial de producción que depende mucho de la fertilidad agronómica de los suelos donde se cultiva. Es sensible a los golpes de sol. El desborre es precoz y, tras una helada de primavera, los brotes secundarios se muestran muy poco fértiles.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Chenin es especialmente sensible a la podredumbre gris, al oídio y a las enfermedades de madera. Por el contrario, tolera mejor el mildiu, el black rot y la antracnosis.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño mediano a pequeño. Esta variedad puede producir, según las condiciones de cultivo y según los terruños (calcáreos, esquistos), o bien vinos espumosos o secos, o bien vinos licorosos. El potencial de acidez es importante y los productos obtenidos son elegantes, generalmente bastante vivos, nerviosos, con aromas de miel.

Selección de clones en Francia

Los catorce clones autorizados de Chenin llevan los números 220, 278, 416, 417, 624, 880, 982, 1018, 1206, 1207, 1208, 1209, 1286 y 1348.

Se han instalado más de 200 clones en un conservatorio de los viñedos de Anjou desde 1996. Una otra colección-conservatorio de una quincena de clones fue plantado en el departamento de Aveyron en 1995.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
220	Maine-et-Loire	ENTAV	media	medio	superior	
	1973	Valle-del-Loira	medio		media	
	6.01 ha			inferior a media		vinos finos, aromáticos y potentes
278	Maine-et-Loire	ENTAV	media	medio	medio	
	1973	Valle-del-Loira	medio			
	0.26 ha					vinos bien equilibrados de buena tipicidad

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas

ENTAV  INRA®

416	Maine-et-Loire	ENTAV	media	superior	inferior	
	1976	Valle-del-Loira	superior			
	0.53 ha		medio a superior			vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

417	Maine-et-Loire	ENTAV	media	superior	inferior	
	1976	Valle-del-Loira	superior			
			medio a superior			vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

624	Maine-et-Loire	ENTAV	media a superior	medio a superior	medio	
	1979	Valle-del-Loira	medio		inferior a media	
	0.69 ha			media a superior		vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

880	Maine-et-Loire	ENTAV	inferior a media	medio	superior	
	1986	Valle-del-Loira	medio a superior			
	4.41 ha			inferior a media		vinos potentes, grasos y vigorosos

ENTAV  INRA®

982	Maine-et-Loire	ENTAV	media	medio	superior	
	1992	Valle-del-Loira	medio			
	2.00 ha					vinos secos grasos y potentes

ENTAV  INRA®

1018	Maine-et-Loire	ENTAV	media	medio	superior	
	1994	Valle-del-Loira	medio			
	1.72 ha			media a superior		buena aptitud para la producción de vinos semi-dulces

ENTAV  INRA®

1206	Maine-et-Loire	INRA - IFV	superior	inferior a medio	superior	
	2014	Valle-del-Loira	inferior		media	
				inferior a media	media a superior	buena aptitud para la producción de vinos semi-dulces de calidad

ENTAV  INRA®

1207	Maine-et-Loire	INRA - IFV	media	inferior	superior	
	2014	Valle-del-Loira	inferior		media	
				media		buena aptitud para la producción de vinos semi-dulces de calidad

ENTAV  INRA®

1208	Maine-et-Loire	INRA - IFV	media a superior	medio	superior	
	2014	Valle-del-Loira	inferior a medio		media	
				media		buena aptitud para la producción de vinos blancos secos de calidad

ENTAV  INRA®

1209	Maine-et-Loire	INRA - IFV	inferior	medio	medio	
	2014	Valle-del-Loira	medio a superior		media a superior	
				media	media	buena aptitud para la producción de vinos blancos secos de calidad

ENTAV  INRA®

1286	Val-de-Loire	Pépinières Mercier - IFV				
	2018					

ENTAV  INRA®

1348	Maine-et-Loire	Pépinières Mercier - IFV				
	2020					

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

