



## Danlas B



### Nombre de la variedad en Francia

Danlas

### Origen

Esta variedad fue obtenida en 1958 por el INRA mediante el cruce entre el Dabouki y el Chasselas.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Danam está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Está clasificado como variedad de vino solo en algunos departamentos (véase normativa en vigor). Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

### Uso

Variedad de uva de vino y de mesa.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

|    | 1979 | 1988 | 2000 | 2008 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|
| ha | 7    | 109  | 321  | 263  | 162  |

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color rojizo,
- a los pámpanos herbáceos con pigmentación antociánica intensa de los nudos y entrenudos,
- a las hojas adultas pentagonales, de cinco o siete lóbulos con un seno peciolar en V poco abierto o cerrado de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes grandes, medianos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica media a elevada de los nervios, un limbo con hinchazón moderada, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y una densidad nula o muy baja de pelos tumbados,

- a las bayas de forma redondeada.

## Perfil genético

| Microsatélite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|---------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Alelo 1       | 131  | 225   | 239   | 176    | 188     | 248     | 240    | 216    | 239    |
| Alelo 2       | 149  | 232   | 249   | 182    | 194     | 252     | 244    | 257    | 271    |

## Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Danlas es una variedad de vigor elevado con un porte horizontal. Sensible al viento, debe ser empalizada y manejarse en poda larga. Es muy poco sensible al millerandaje y a la corredura.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Danlas es muy sensible a la excoriosis, al mildiu y al oídio. Por el contrario, es poco sensible a la podredumbre gris.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos del Danlas son grandes, moderadamente compactos, con un pedúnculo largo y pigmentado. Son homogéneos, fáciles de vendimiar y embalar. Las bayas son medianas a grandes. La piel es gruesa y la pulpa relativamente jugosa, blanda y de sabor neutro. La aptitud para el transporte y la conservación del Danlas es óptima. Una vez vinificado, el Danlas produce unos vinos vulgares y poco aromáticos.

## Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Danlas lleva el número 499.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

| N° de Clon | Identidad y disponibilidad         |                         | Datos agronómicos   |                                    | Datos tecnológicos    |                      |
|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|            | Origen                             | Selección               | Fertilidad          | Nivel de producción                | Contenido en azúcares | Potencial de color   |
|            | Año de autorización                | Referencias agronómicas | Peso de los racimos | Vigor                              | Acidez total          | Estructura tánica    |
|            | Superficie de multiplicación (año) |                         | Tamaño de las bayas | Sensibilidad a la podredumbre gris | Intensidad aromática  | Aptitudes enológicas |
| 499        | 1976                               | INRA                    |                     |                                    |                       |                      |

ENTAV INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

