



Duras N



Nombre de la variedad en Francia

Duras

Origen

Esta variedad es originaria de la región de Gaillac o Ariège. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Savagnin y el Tressot.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos reglamentarios

En Francia, el Duras está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	87	75	476	761	949	1063	794

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales muy profundos, con fondo en U y un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar con fondo en ocasiones limitado por el nervio de un lado cerca del peciolo, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo alabeado, con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	137	223	243	176	188	246	238	233	239
Alelo 2	149	236	249	186	200	256	248	267	271

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Esta variedad con una buena fertilidad debe manejarse preferentemente en poda corta. Las ramas y los troncos de la Duras son duros y su porte es erguido.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Duras es bastante sensible a la excoresis, al oídio, a los ácaros (sobre todo en primavera) y a la eutiposis.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño mediano. El Duras posee un buen potencial de acumulación de azúcares. Los vinos obtenidos presentan un color moderado, pero poseen una tipicidad marcada (notas de pimienta).




Selección de clones en Francia

Los cuatro clones autorizados de Duras llevan los números 554, 555, 627 y 654. Desde 1998, se conservan más de 120 clones en los viñedos de Gaillac (Tarn).

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

Nº de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
554	Tarn	ENTAV	media	medio	superior	
	1978	Tarn	medio			
	1.54 ha					vinos muy típicos de la variedad
ENTAV 						
555	Tarn	ENTAV	media	medio	superior	
	1978	Tarn	inferior a medio			
	0.44 ha					vinos muy típicos de la variedad
ENTAV 						
627	Tarn	ENTAV	media a superior	medio a superior	medio a superior	
	1979	Tarn	medio a superior			
	0.44 ha					vinos típicos de la variedad
ENTAV 						
654	Tarn	ENTAV	media a superior	medio a superior	inferior a medio	

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1980	Tarn	medio a superior				
						vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

