



## Ekigaïna N



### Nombre de la variedad en Francia

Ekigaïna

### Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA en 1955 y es el resultado de un cruce entre el Tannat y el Cabernet-Sauvignon.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Ekigaïna está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	2000	2008	2018
ha	4	4	2.8

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo rojizo,
- a las hojas adultas pentagonales, de cinco o siete lóbulos con un seno peciolar poco abierto en U o de lóbulos ligeramente superpuestos y con fondo a menudo limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes medianos de lados convexos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos erguidos y baja densidad de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

### Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
<b>Alelo 1</b>	149	236	239	172	188	240	238	233	239
<b>Alelo 2</b>	153	238	249	182	194	248	254	233	255

## Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Esta variedad de vigor medio, de porte semi-erguido debe ser empalizada y manejarse en poda larga.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Ekiğaïna no parece presentar sensibilidad particular a las enfermedades.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son de tamaño mediano. El Ekiğaïna permite elaborar vinos con un color óptimo, típicos, equilibrados, bastante cálidos y relativamente poco ácidos.

## Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Ekiğaïna lleva el número 981.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
981		INRA				
	1991	Bordelés Sudoeste				

ENTAV  INRA®



Esta obra está puesta a disposición según los términos de la [Licencia Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)