



Gamay de Chaudenay N



Nombre de la variedad en Francia

Gamay de Chaudenay

Origen

Esta variedad procedería de una mutación del Gamay de Bouze.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos reglamentarios

En Francia, el Gamay de Chaudenay está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1998	2008	2018
ha	119	92	375	247	99

Véase Gamay Fréaux

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes bronceadas,
- a las bayas que presentan un color gris de la epidermis antes del envero y una pulpa con color al madurar.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	232	239	178	194	244	238	216	239

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 2	135	236	249	186	204	246	238	245	271

Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Esta variedad es poco vigorosa, pero garantiza una producción regular. Sus cualidades son comparables a las del Gamay.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El comportamiento del Gamay de Chaudenay frente a las enfermedades y las plagas es comparable al del Gamay.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son pequeños y las bayas son pequeñas a medianas. Los vinos obtenidos presentan un buen color (menos que el Gamay Fréaux, pero mucho más que el Gamay de Bouze). Son menos afrutados que los elaborados a partir del Gamay.

Selección de clones en Francia

Los dos clones autorizados de Gamay de Chaudenay llevan los números 567 y 568. En 2006, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una treintena de clones en los viñedos de Ródano.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
567	Val-de-Loire	ENTAV	superior	superior	inferior a medio	muy superior
	1978	Beaujolais	medio a superior	medio	media	superior
			medio	media a superior		vinos afrutados, estructurados, con una buena color

ENTAV  INRA®

568	Val-de-Loire	ENTAV	superior	superior	inferior a medio	
	1978	Beaujolais	medio a superior	medio	media	
			medio	media a superior		vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Esta obra está puesta a disposición según los términos de la [Licencia Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

