



Macabeu B



Nombre de la variedad en Francia

Macabeu

Origen

Esta variedad es originaria de España, probablemente de Cataluña. Según los análisis genéticos publicados, el Macabeu sería el resultado de un cruce entre el Gibi y el Brustiano faux.

Sinonimia

En la Unión Europea, el Macabeu es oficialmente denominado con otros nombres: Macabeo (España), Maccabeau (Grecia) y Viura (España). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Macabeu está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: España y Grecia.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	4429	5975	7077	7621	5771	3536	1636

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- al pámpano con entrenudos con frecuencia achatados y estriados,
- a las hojas adultas de gran tamaño, de cinco lóbulos con un seno peciolar poco abierto o cerrado, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo verde claro brillante, con bordes hacia el haz en el borde y, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	232	239	186	188	244	238	235	249
Alelo 2	143	234	239	191	188	258	240	257	255

Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Macabeu es una variedad productiva, vigorosa, de porte erguido, que se puede manejar en poda corta. Es sensible al viento. Hay que evitar plantarla en lugares frescos y húmedos, así como en suelos demasiado secos, donde se muestra proclive al apoplegia y a una caída precoz de las hojas.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Macabeu se muestra bastante sensible a los ácaros, a la podredumbre gris y a la necrosis bacteriana.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son muy grandes y las bayas de medianas a grandes. En función de las condiciones de cultivo, el Macabeu permite obtener vinos blancos secos, espumosos o incluso vinos dulces naturales. Los vinos blancos secos y espumosos son ligeros, agradables, pero suelen carecer de acidez y finura. Los aromas (con notas ocasionales de hinojo) también son poco intensos.

Selección de clones en Francia

Los diez clones autorizados de Macabeu llevan los números 630, 631, 632, 633, 706, 735, 736, 737, 789 y 1025. Un conservatorio de unos sesenta clones fue instalado en los Pirineos Orientales entre 1979 y 1980. Un otro conservatorio de 60 clones fue implantado en el departamento de Aude en 2010.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
630	Pyrénées-Orientales	ENTAV	media	medio	medio a superior	
	1979	Rosellón	medio		media a superior	
	0.73 ha					vinos típicos de la variedad
631	Pyrénées-Orientales	ENTAV	inferior	inferior a medio	medio	

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1979	Rosellón	medio				
0.73 ha					vinos típicos de la variedad	

ENTAV  INRA®

632	Pyrénées-Orientales	ENTAV	media	medio	irregular	
	1979	Rosellón	medio			
	0.15 ha					vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

633	Pyrénées-Orientales	ENTAV	media a superior	medio	superior	
	1979	Rosellón	medio			
	0.19 ha					vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

706	Pyrénées-Orientales	ENTAV			inferior a medio	
	1980	Rosellón	medio			
	0.26 ha					vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

735	Pyrénées-Orientales	INRA	media	medio	medio a superior	
	1981	Aude Rosellón	medio			
	0.53 ha					vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

736	Pyrénées-Orientales	INRA	media	medio	medio	
	1981	Aude Rosellón	medio			
	0.18 ha					vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

737	Pyrénées-Orientales	INRA	media	medio	medio	
	1981	Aude Rosellón	medio			
						vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

789	Pyrénées-Orientales	ENTAV	media a superior	superior	inferior	
	1984	Rosellón	superior			
	0.45 ha					vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®

1025	Pyrénées-Orientales	ENTAV	media	medio	medio	
	1995	Rosellón	medio		media	
						vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)