



## Mayorquin B



### Nombre de la variedad en Francia

Mayorquin

### Origen

Esta variedad podría ser originaria del Norte de África, donde recibe el nombre de Farana.

### Sinonimia

En la Unión Europea, el Mayorquin es oficialmente denominado con otros nombres: Alicante banco (Portugal), Damaschino (Italia) y Planta fina de Pedralba (España). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Mayorquin está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de España, Italia y Portugal.

### Uso

Variedad de uva de vino.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia



### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad muy elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- al pámpano con entrenudos con sección transversal achatada o estriada,
- a las hojas adultas de color verde claro, de gran tamaño, de cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o lóbulos ligeramente superpuestos y un diente bastante frecuente en el borde, dientes medianos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, peciolo con color, un limbo liso, brillante, con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica.

## Perfil genético

| Microsatélite  | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Alelo 1</b> | 141  | 225   | 239   | 176    | 186     | 252     | 240    | 247    | 249    |
| <b>Alelo 2</b> | 143  | 238   | 243   | 191    | 188     | 258     | 254    | 257    | 271    |

## Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Mayorquin es una variedad muy vigorosa, fértil y productiva. Debe manejarse en poda corta. El Mayorquin se adapta bien a terrenos secos, arenosos o arcillosos.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Mayorquin es, sobre todo, sensible al mildiu. Es poco sensible a la podredumbre gris.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos y las bayas son muy grandes. El Mayorquin produce unos vinos vulgares, neutros y mediocres.

## Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Mayorquin lleva el número 1119.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

| N° de Clon | Identidad y disponibilidad         |                         | Datos agronómicos   |                                    | Datos tecnológicos    |                              |
|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|            | Origen                             | Selección               | Fertilidad          | Nivel de producción                | Contenido en azúcares | Potencial de color           |
|            | Año de autorización                | Referencias agronómicas | Peso de los racimos | Vigor                              | Acidez total          | Estructura tánica            |
|            | Superficie de multiplicación (año) |                         | Tamaño de las bayas | Sensibilidad a la podredumbre gris | Intensidad aromática  | Aptitudes enológicas         |
| 1119       | Hérault<br>2008                    | IFV                     |                     |                                    |                       |                              |
|            |                                    |                         |                     |                                    |                       | vinos típicos de la variedad |

ENTAV  INRA®



Esta obra está puesta a disposición según los términos de la [Licencia Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

