



Mondeuse N



Nombre de la variedad en Francia

Mondeuse

Origen

Esta variedad es originaria de Saboya. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, la Mondeuse sería el resultado de un cruce entre la Mondeuse blanche y el Tressot.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos reglamentarios

En Francia, la Mondeuse está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificada.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| ha | 1066 | 930 | 194 | 173 | 237 | 288 | 298 |

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas pentagonales, de tres o cinco lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o cerrado, un lóbulo central alargado, dientes cortos, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antociánica nula de los nervios, un limbo con hinchazón leve, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Perfil genético

| Microsatélite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|---------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Alelo 1 | 131 | 223 | 239 | 186 | 194 | 246 | 238 | 216 | 239 |
| Alelo 2 | 137 | 229 | 260 | 186 | 194 | 260 | 240 | 216 | 239 |

Fenología

época de desborre: como la variedad Chasselas.

época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

La Mondeuse es una variedad de vigor óptimo, que debe manejarse en poda corta. Además, la Mondeuse es sensible a la clorosis y a la sequía. De forma generalizada, se adapta bastante bien a los cantizales arcilloso-calcáreos y pedregosos en ladera.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

La Mondeuse es poco sensible a la podredumbre gris y a la excoriosis. Por el contrario, es sensible a los ácaros, al oídio y al mildiu.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño mediano. La Mondeuse permite elaborar vinos de gran tipicidad, tánicos, con buen color, bien provistos de aromas y aptos para el envejecimiento. El potencial en azúcares de esta variedad es medio con una acidez buena.

Selección de clones en Francia

Los cuatro clones autorizados de Mondeuse llevan los números 368, 822, 926 y 1326.

Un conservatorio de una veintena de clones fue plantado en Saboya entre 2014 y 2015.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

Descripción de clones autorizados en Francia

| N° de Clon | Identidad y disponibilidad | | Datos agronómicos | | Datos tecnológicos | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Origen | Selección | Fertilidad | Nivel de producción | Contenido en azúcares | Potencial de color |
| | Año de autorización | Referencias agronómicas | Peso de los racimos | Vigor | Acidez total | Estructura tánica |
| 368 | Savoie | ENTAV | inferior a media | inferior a medio | medio a superior | |
| | 1978 | Domaine de l'Espiguette Saboya | inferior | | media | |
| | 0.53 ha | | medio a superior | media a superior | | vinos típicos de la variedad |
| 822 | Savoie | ENTAV | inferior a media | inferior a medio | medio | |
| | 1985 | Domaine de l'Espiguette Saboya | inferior a medio | | inferior a media | |
| | | | | | | vinos típicos de la variedad |

| N° de Clon | Identidad y disponibilidad | | Datos agronómicos | | Datos tecnológicos | |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Origen | Selección | Fertilidad | Nivel de producción | Contenido en azúcares | Potencial de color |
| | Año de autorización | Referencias agronómicas | Peso de los racimos | Vigor | Acidez total | Estructura tánica |
| | Superficie de multiplicación (año) | | Tamaño de las bayas | Sensibilidad a la podredumbre gris | Intensidad aromática | Aptitudes enológicas |
| 926 | Savoie | ENTAV | media a superior | superior | inferior a medio | |
| | 1988 | Domaine de l'Espigette Saboya | superior | | media | |
| | 0.36 ha | | superior | | | vinos típicos de la variedad |

ENTAV  INRA®

| | | | | | | |
|------|--------|--------------------------|--|--|--|--|
| 1326 | Savoie | Sicarex Beaujolais - IFV | | | | |
| | 2019 | | | | | |

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

