



Oberlin noir N



Nombre de la variedad en Francia

Oberlin noir

Origen

El Oberlin noir (híbrido interespecífico) procede de un cruce entre el Gamay y *Vitis riparia*.

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "595 Orbelin" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos reglamentarios

En Francia, el Oberlin noir está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| | 1958 | 1968 | 2000 | 2008 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|
| ha | 4500 | 2903 | 68 | 64 | 62 |

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven semiabierto que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- a las hojas adultas cuneiformes, de cinco lóbulos, con un seno peciolar en U abierto a poco abierto, en ocasiones limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, un limbo con hinchazón fina, abultado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o ligeramente elíptica.

Perfil genético

| Microsatélite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|---------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Alelo 1 | 131 | 232 | 239 | 186 | 187 | 246 | 238 | 216 | 239 |
| Alelo 2 | 157 | 263 | 253 | 214 | 194 | 258 | 266 | 235 | 239 |

Fenología

Época de desborre: 5 días antes de la variedad Chasselas.

Época de maduración: precoz, media semana antes de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Oberlin noir es una variedad vigorosa y fértil, con un porte semi-erguido que debe manejarse en poda larga.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Oberlin noir es resistente al mildiu y al oídio. Siempre que sea posible, debe injertarse.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son pequeños a medianos, poco compactos y las bayas son pequeñas. El potencial de acumulación de azúcares de esta variedad es muy bueno. El Oberlin noir permite elaborar unos vinos de calidad mediocre, de gran coloración, con presencia de antocianinas diglucósidas.

Selección de clones en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



Esta obra está puesta a disposición según los términos de la [Licencia Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

