



Opalor B



Nombre de la variedad en Francia

Opalor

Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRAE. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre un descendiente de *Muscadinia rotundifolia* y el Bronner.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos reglamentarios

En Francia, el Opalor está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2022 en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Elementos de descripción

[Traducción en curso]

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	135	225	239	186	188	246	238	235	249
Alelo 2	143	236	239	186	188	260	240	243	271

Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media a 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

[Traducción en curso]

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

[Traducción en curso]

Potenciales tecnológicos

[Traducción en curso]

Selección de clones en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Referencias bibliográficas

[Traducción en curso]



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

