



Saint-Pierre doré B



Nombre de la variedad en Francia

Saint-Pierre doré

Origen

Esta variedad autóctona de Allier es, según los análisis genéticos publicados, probablemente una descendiente del Gouais blanc y de la Sauvignonasse.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos reglamentarios

En Francia, el Saint-Pierre doré está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	2018
ha	123	81	6	2	0.3

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar poco abierto o de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes muy largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo alabeado, abultado y con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	225	239	176	188	238	240	233	255
Alelo 2	141	232	239	182	196	252	254	245	271

Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Saint-Pierre doré es una variedad de vigor medio, bastante productiva, que se ha de manejar en poda larga moderada.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Saint-Pierre doré es extremadamente sensible a la podredumbre gris pero, por el contrario, es bastante resistente al oídio y al mildiu.

Potenciales tecnológicos

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. El Saint-Pierre doré produce unos vinos comunes, de bajo grado alcohólico y relativamente ácidos, que pueden utilizarse como vinos de base para espumosos.

Selección de clones en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)