



## Semillon B



### Nombre de la variedad en Francia

Semillon

### Origen

Esta variedad es originaria del viñedo bordelés.

### Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

### Datos reglamentarios

En Francia, el Semillon está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre, Croacia, España, Grecia, Hungría, Italia, Portugal y República Checa.

### Uso

Variedad de uva de vino y para aguardiente.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	35993	34129	23340	17573	14969	12535	10287

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de color verde claro o verde medio, de cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto o poco abierto, dientes cortos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica baja o muy baja de los nervios, un limbo ligeramente alabeado, con hinchazón uniforme y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

## Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	234	239	172	188	248	240	233	239
Alelo 2	131	236	257	182	194	252	248	243	271

## Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.

## Aptitudes para el cultivo y agronómicas

Variedad de vigor medio y bastante productiva, el Semillon se puede manejar en poda larga moderada o en poda corta. Esta variedad reacciona de una manera especial a la fertilidad agronómica del medio. De este modo, sus rendimientos pueden variar mucho en función de las regiones. Parece adaptarse bien a los terrenos con grava o arcilloso-calcareos.

## Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Semillon es sensible a la podredumbre gris, al black rot (en hojas jóvenes), así como a los ácaros y a los cicadélidos. Por el contrario, es poco sensible al oídio y a la eutipiosis.

## Potenciales tecnológicos

Los racimos son medianos y las bayas son grandes. El Semillon, en condiciones de cultivo favorables y en vides adultas con rendimientos controlados, produce unos vinos blancos secos de buena calidad, con gran cualidad grasa y una acidez media a baja. Estos vinos se pueden vinificar en bodega y son aptos para el envejecimiento. El Semillon permite, como es natural, elaborar unos vinos blancos licorosos de gran calidad.

## Selección de clones en Francia

Los siete clones autorizados de Semillon llevan los números 173, 299, 315, 380, 908, 909 y 910. Dos conservatorios de más de 130 clones en total fue plantado en los viñedos bordeleses en 1997 y 2011.

## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.

## Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
173	Gironde	ENTAV	media	medio	medio a superior	
	1972	Bordelés	medio			
	4.29 ha					vinos secos y semi-dulces equilibrados
ENTAV 						
299	Gironde	ENTAV	media a superior	medio	medio	
	1973	Bordelés	medio			
	1.91 ha					vinos típicos de la variedad
ENTAV 						
315	Gironde	INRA	media	medio	medio	
	1973	Bordelés	medio			

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
5.91 ha					vinos típicos de la variedad	
<b>ENTAV INRA®</b>						
380	Gironde	ENTAV	superior	superior	medio	
	1975	Bordelès	medio			
	0.10 ha					vinos típicos de la variedad
<b>ENTAV INRA®</b>						
908	Gironde	INRA	media	medio a superior	medio	
	1987	Bordelès	medio			
	1.14 ha					vinos típicos de la variedad
<b>ENTAV INRA®</b>						
909	Gironde	INRA	media	medio	superior	
	1987	Bordelès	medio			
	2.55 ha					vinos típicos de la variedad
<b>ENTAV INRA®</b>						
910	Dordogne	INRA	media	medio	medio a superior	
	1987	Bordelès	medio			
	1.35 ha					vinos típicos de la variedad
<b>ENTAV INRA®</b>						



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

