



Tinta Barroca N



Nombre de la variedad en Francia

Tinta Barroca

Origen

Esta variedad es originaria de Portugal, probablemente de la región del Duero. Según los análisis genéticos publicados, la Tinta Barroca sería el resultado de un cruce entre el Touriga nacional y el Mourisco tinto.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos reglamentarios

En Francia, la Tinta Barroca está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A, pero todavía no está clasificada. Esta variedad también está inscrita en el catálogo de Portugal.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

ha

2018

0

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas o cobrizas, con una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos verdes o con estrías ligeramente rojizas,
- a las hojas adultas orbiculo-reniformes, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar abierto en V, dientes largos en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo fino, alabeado, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	141	225	239	178	188	246	248	233	251
Alelo 2	149	234	243	180	192	248	254	243	271

Fenología

Época de desborre: como la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media a 2 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

La Tinta Barroca es vigorosa y tiene un porte semi-erguido. Es preferible empalzar y gestionar en poda larga pues puede resultar poco fértil en poda corta. No se adapta especialmente bien a la sequía y es sensible al tostado. Debe plantarse preferentemente en suelos bastante profundos que permitan una alimentación hídrica suficiente.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

La Tinta Barroca es sensible al mildiu, al oídio y a los cicadélidos de la vid. Esta variedad es moderadamente sensible a la podredumbre gris y a la excoriosis.

Potenciales tecnológicos

Los racimos de Tinta Barroca son medianos a grandes y moderadamente compactos. Las bayas son medianas, de sabor simple, con un pellejo fino y una pulpa jugosa. Los vinos presentan un color intenso. En terrenos elevados, esta variedad produce unos vinos con una estructura tánica ligera y aromas florales. En caso de exceso de maduración, los vinos se concentran y presentan un elevado potencial de envejecimiento. No obstante, pueden presentar falta de acidez.

Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Tinta Barroca lleva el número 1189.

Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- O grande livro das castas. I. Böhm, 2007, Ed. Chaves Ferreira, Portugal.
- Câtalogo das castas para vinho cultivadas em Portugal. R. Faustino, 2011, Ed. Instituto da Vinha e do Vinho, I.P, Portugal.
- Grape Cultivars for Wine Production in South Africa. P.G. Goussard, 2008, Ed. Cheviot, Sudáfrica.
- Wine Grapes. J. Robinson et al, 2012, Ed. Penguin, Inglaterra.

Descripción de clones autorizados en Francia

Nº de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1189	Portugal	IFV				

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
2012	Languedoc-Rosellón					
						vinos típicos de la variedad

ENTAV  INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

