



Vidoc N



Nombre de la variedad en Francia

Vidoc

Origen

La variedad Vidoc fue obtenida por el INRA. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el INRA 3082-1-42 y el Regent.

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos reglamentarios

En Francia, el Vidoc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» desde 2018, en la lista A y está clasificado.

Uso

Variedad de uva de vino.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia



Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas, con una densidad muy baja a baja de pelos tumbados y erguidos,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos alargados de estrías rojas, nudos aplanados y una sección acanelada,
- a las hojas adultas orbiculares de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar abierto a poco abierto, en V o en U, dientes largos a muy largos en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica baja de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,

- a las bayas de forma achatada o redondeada.

Perfil genético

Microsatélite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Alelo 1	131	223	247	176	200	252	240	227	239
Alelo 2	151	229	253	182	204	260	240	233	271

Fenología

Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Aptitudes para el cultivo y agronómicas

El Vidoc es una variedad vigorosa, fértil o de porte horizontal a rastrero. Su manejo precisa una cuidada colocación en espaldera. El Vidoc es muy sensible a la carencia de magnesio. Puede presentar algunas dificultades de agostamiento por su interrupción tardía del ciclo vegetativo.

Sensibilidad a las enfermedades y a las plagas

El Vidoc es resistente al mildiu y al oídio, pero es sensible al black rot. También es bastante tolerante a la podredumbre gris.

Potenciales tecnológicos

Los racimos del Vidoc son medianos y compactos. Las bayas son pequeñas a medianas, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa blanda y jugosa. Los vinos son vigorosos, con color y equilibrio adecuados y una acidez correcta. Los aromas dominantes son las frutas y las especias.

Selección de clones en Francia

El único clon autorizado de Vidoc lleva el número 1268.

Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centro de Recursos Biológicos de la Vid de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, Francia.

- [Fiche variétale Vidoc](#), C. Schneider, 2018.

Descripción de clones autorizados en Francia

N° de Clon	Identidad y disponibilidad		Datos agronómicos		Datos tecnológicos	
	Origen	Selección	Fertilidad	Nivel de producción	Contenido en azúcares	Potencial de color
	Año de autorización	Referencias agronómicas	Peso de los racimos	Vigor	Acidez total	Estructura tánica
	Superficie de multiplicación (año)		Tamaño de las bayas	Sensibilidad a la podredumbre gris	Intensidad aromática	Aptitudes enológicas
1268	Haut-Rhin 2017	INRA - IFV				

ENTAV INRA®



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](#)

