



Amandin B



Nom de la variété en France

Amandin

Origine

Cette variété a été obtenue en 1979 par l'INRA. Il s'agit d'un hybride interspécifique issu d'un croisement entre le 7489 INRA et le Muscat de Hambourg.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Amandin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A.

Utilisation

Variété d'agrément pour amateurs.

Evolution des surfaces cultivées en France



Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles brillantes, vertes à plages bronzées ou rougeâtres,
- aux feuilles adultes cunéiformes, entières ou à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert, des dents moyennes à longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou très faible, un limbe lisse, brillant, involuté, et à la face inférieure une densité nulle ou très faible des poils couchés et une densité faible des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique ou ovoïde, à saveur légèrement muscatée.

Profil Génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allèle 1 | 133 | 229 | 247 | 176 | 186 | 256 | 240 | 235 | 255 |
| Allèle 2 | 143 | 236 | 249 | 186 | 192 | 262 | 254 | 243 | 271 |

Phénologie

Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Amandin présente une vigueur moyenne à forte. C'est une variété assez fertile avec un port demi-érigé à horizontal. L'Amandin peut être conduit en taille longue modérée et doit être palissé.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Amandin est peu sensible au mildiou, à l'oïdium, à l'antracnose, au black rot et à la pourriture grise mais il doit être greffé.

Potentialités technologiques

Les grappes de l'Amandin sont moyennes à grosses, peu compactes et les baies sont moyennes, juteuses, avec une pellicule épaisse.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Amandin porte le numéro 5002.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro | Montpellier, Marseillan, France.

Description des clones agréés en France

| N° de Clone | Identité et disponibilités | | Données Agronomiques | | Données Technologiques | |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Origine | Sélection | Fertilité | Niveau de production | Richesse en sucre | Potentiel couleur |
| | Année d'agrément | Références Agronomiques | Poids des grappes | Vigueur | Acidité totale | Structure tannique |
| | Surface en multiplication (année) | | Taille de baies | Sensibilité à la pourriture grise | Intensité aromatique | Aptitudes œnologiques |
| 5002 | 1987 | INRA | | | | |



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)