



Bourboulenc B



Nom de la variété en France

Bourboulenc

Origine

Ce cépage semble être d'origine provençale.

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Doucillon blanc" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Bourboulenc est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France

| | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 2000 | 2008 | 2018 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| ha | 1279 | 703 | 373 | 723 | 771 | 661 | 509 |

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux feuilles adultes pentagonales, à trois lobes avec un sinus pétiolaire à lobes très chevauchants et présence assez fréquente d'une dent sur le bord, un lobe central allongé, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, un limbe bullé, mat, ondulé entre les nervures près du point Pétiolaire, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique et qui présentent une peau épaisse.

Profil Génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|-----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allèle 1 | 131 | 223 | 239 | 182 | 186 | 246 | 240 | 233 | 255 |
| Allèle 2 | 131 | 223 | 239 | 186 | 196 | 252 | 248 | 257 | 255 |

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage est de fertilité moyenne. Il doit être taillé court et conduit avec un palissage suffisant en raison de son port demi-retombant. Le Bourboulenc est bien adapté à la sécheresse. La maturation de ce cépage est lente et il est nécessaire de le cultiver dans les terroirs chauds et bien exposés pour atteindre une complète maturité.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Bourboulenc est sensible à l'oïdium mais résiste bien à la pourriture grise.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont de taille moyenne. Le Bourboulenc permet d'élaborer des vins fins, de niveau alcoolique peu élevé, et moyennement intenses au niveau aromatique.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Bourboulenc portent les numéros 541 et 1002.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Description des clones agréés en France

| N° de Clone | Identité et disponibilités | | Données Agronomiques | | Données Technologiques | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | <i>Origine</i> | <i>Sélection</i> | <i>Fertilité</i> | <i>Niveau de production</i> | <i>Richesse en sucre</i> | <i>Potentiel couleur</i> |
| | <i>Année d'agrément</i> | <i>Références Agronomiques</i> | <i>Poids des grappes</i> | <i>Vigueur</i> | <i>Acidité totale</i> | <i>Structure tannique</i> |
| | <i>Surface en multiplication (année)</i> | | <i>Taille de baies</i> | <i>Sensibilité à la pourriture grise</i> | <i>Intensité aromatique</i> | <i>Aptitudes œnologiques</i> |
| 541 | Vaucluse | ENTAV | | | | |
| | 1978 | Languedoc | | | | |

ENTAV INRA®

Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques de la variété.

| | | | | | | |
|------|----------|-----------|--|--|--|--|
| 1002 | Vaucluse | ENTAV | | | | |
| | 1993 | Languedoc | | | | |

ENTAV INRA®

Clone peu diffusé, conforme aux caractéristiques de la variété.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

