



Oberlin noir N



Nom de la variété en France

Oberlin noir

Origine

L'Oberlin noir (hybride interspécifique) provient d'un croisement entre le Gamay et *Vitis riparia*.

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "595 Oberlin" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, l'Oberlin noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Evolution des surfaces cultivées en France

	1958	1968	2000	2008	2018
ha	4500	2903	68	64	62

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau demi-ouverte qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes cunéiformes, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire en U ouvert à peu ouvert, parfois limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, un limbe finement bullé, gaufré près du point pétiolaire, et à la face inférieure une densité faible à moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	131	232	239	186	187	246	238	216	239
Allèle 2	157	263	253	214	194	258	266	235	239

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : précoce, 1 demi-semaine avant le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Oberlin noir est une variété vigoureuse et fertile avec un port demi-érigé qui doit être conduite en taille longue.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Oberlin noir résiste bien au mildiou et à l'oïdium. Il doit de préférence être greffé.

Potentialités technologiques

Les grappes sont petites à moyennes, peu compactes et les baies sont petites. Le potentiel d'accumulation des sucres de cette variété est très bon. L'Oberlin noir permet d'élaborer des vins de qualité médiocre, très colorés, avec présence d'anthocyanes diglucosides.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

