



Victoria B



Nom de la variété en France

Victoria

Origine

Cette variété de raisin de table a été obtenue en 1964 en Roumanie par V. Lepadatu et Condei en croisant le Cardinal par le Dattier de Beyrouth.

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Victoria est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Autriche, Bulgarie, Italie et Roumanie.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Evolution des surfaces cultivées en France



Éléments de description

L'identification fait appel:

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité nulle des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux herbacés de couleur verte,
- aux feuilles adultes cunéiformes, à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire ouvert et à fond en U, des dents grosses, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe bullé, tourmenté, et face inférieure, une densité nulle des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Profil Génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allèle 1	133	223	239	182	186	244	254	233	251
Allèle 2	133	234	249	182	188	252	254	267	257

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Victoria possède une forte vigueur et a un port demi-érigé. C'est une variété qui doit être palissée et qui peut être conduite en taille courte ou en taille longue.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Victoria est peu sensible à la pourriture grise.

Potentialités technologiques

Les grappes du Victoria sont moyennes à grosses, moyennement compactes et de belle présentation. Les baies sont grosses à pellicule épaisse et à pulpe juteuse.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Victoria portent les numéros 6009 et 6010.

Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien [[site web](#), consulté en 2020].

Description des clones agréés en France

N° de Clone	Identité et disponibilités		Données Agronomiques		Données Technologiques	
	Origine	Sélection	Fertilité	Niveau de production	Richesse en sucre	Potentiel couleur
6009	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
	Vaucluse 2006 0,04 ha	IFV Languedoc	moyenne inférieur à moyen supérieure	moyen	moyenne moyenne	
6010	Année d'agrément	Références Agronomiques	Poids des grappes	Vigueur	Acidité totale	Structure tannique
	Surface en multiplication (année)		Taille de baies	Sensibilité à la pourriture grise	Intensité aromatique	Aptitudes œnologiques
	Vaucluse 2006 0,03 ha	IFV Languedoc	inférieure à moyenne moyenne	inférieur à moyen	moyenne moyenne à supérieure	

ENTAV  INRA®

ENTAV  INRA®



